

頭のけが(大人)

主な 症状

「頭を打った」 「頭にけがをした」
「頭をぶつけた」 など

赤

- ☐ 意識をなくした。
- ☐ 嘔吐、または、吐き気がある。
- ☐ 手足に力が入らなかったり、しびれたりする。
- ☐ 頭を打ったことを覚えていない。
- ☐ 頭の他にもけががある。
- ☐ おかしなことを言ったり、反応が悪くなってきた。
- ☐ 眼が見えにくかったり、二重に見える。
- ☐ 頭痛がひどくなってきた。
- ☐ フラフラしている。または、めまいがする。
- ☐ 意識がもうろうとしてきた。
- ☐ 元気がない。
- ☐ 頭（頭皮）や耳（耳の穴）からの出血や鼻血がある。
- ☐ 顔色が真っ青である。
- ☐ けいれん（ひきつけ）があった。

いいえ

はい

119

黄

- ☐ 打ったところが痛い。または、腫れている。 外科系
- ☐ たんこぶがある。 外科系
- ☐ けがをしたことを最初から全部覚えている。または、けがの前後のことを覚えている。 外科系
- ☐ 血がにじんでいる。 外科系

いいえ

はい

- ☐ 妊娠している
- ☐ 歩けない

はい

119

いいえ

今すぐ受診

緑

- ☐ 頭を打った、ぶつけた。 外科系
- ☐ 心配である。 外科系

いいえ

はい

- ☐ 妊娠している
- ☐ 歩けない

はい

今すぐ受診

いいえ

当日又は翌日の
通常時間に受診



すべての項目に該当しない場合

現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合や
変わらず続く場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。