

頭・首のけが（こども）

主な 症状

「頭をぶつけた」 「落ちた」
「頭から血が出た」 など

赤

- ☐ 数回にわたって吐いている。
- ☐ 片側の腕があがらない。または、反対側と比べてあがりが悪い。または、腕のあがり具合に左右差がある。
- ☐ サラサラした液体が鼻、または、耳からポタポタと出ている。
- ☐ 押さえても、鼻血が止まらない。または、直接ぶつけていないのに耳から血が出ている。
- ☐ 頭からの出血が多い。または、出血をタオルやガーゼで圧迫しても止まらない。
- ☐ 首をかしげる姿勢をとっている。または、まっすぐ体を向かせても横を向いてしまう。
- ☐ 手足で動きにくいところがある。または、手足にしびれがある。
- ☐ けがをした後、または、けがをした時に意識がなくなった。
- ☐ 意識はしっかりしているが、頭が痛いと言っている。
- ☐ めまいがする。
- ☐ 目が見えにくかったり、ものが二重に見えたりする。
- ☐ 1回吐き、さらに元気がない。
- ☐ 同じことを何度も質問する。
- ☐ 首の後ろ側をさわると痛がる。

いいえ

はい

119

黄

- ☐ 起こせば起きるが、元気がない。 外科系
- ☐ 頭から出血していたが今は止まった。または、タオルやガーゼで圧迫して止まっている。 外科系
- ☐ 38℃以上の熱がある。 外科系
- ☐ 1回吐いたが、その後は普通である。 外科系
- ☐ 大きなこぶがあるが、普段と様子に変わりはない。 外科系

いいえ

はい

今すぐ受診

緑

- ☐ 普段ととくに変わった様子はない。（37℃台の熱を含む） 外科系
- ☐ けがをしてからすでに2日（48時間）以上経っているが心配だ。 外科系

いいえ

はい

当日又は翌日の
通常時間に受診



すべての項目に該当しない場合

継続的に様子を見て、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現した場合は、医療機関の受診を考慮してください。



- けがをしてから48時間は、できるだけ安静にしましょう。
- 鼻血のときは、①小鼻を指でつまむようにしっかり押さえ、安静にさせる、②後頭部は叩かない、③前かがみに座り、血液を飲み込まず吐き出させる、ことに注意し止血してください。