

発疹(こども)

主な 症状

「発疹」 「皮膚のブツブツ」 「湿疹」 「蕁麻疹」
「体がかゆそう」 など

- 眼の周りや顔がむくんできた。
- 呼吸が苦しい、声がかされる、咳の症状がある。
- 今までにひどいアレルギー症状が出たことがある。
- 急に口の中や舌が腫れてきた。
- 赤や紫色の押しても消えない発疹があり、その他にたくさんみられる。

赤

いいえ

はい

119

黄

- 全身に盛り上がった発疹があり、かゆがっている。 内科系 外科系
- かゆくて眠れない。 内科系 外科系
- 発熱、目やに、咳、鼻水などがひどく、元気がない。 内科系 外科系
- 薬を飲んだら発疹が出た。 内科系 外科系
- 小さな水ぶくれがポチポチと出てきた。 内科系 外科系
- 盛り上がった発疹が散在していて、かゆがっている。 内科系 外科系
- 舌にイチゴのようなザラザラがある。 内科系 外科系
- 眼や唇が真っ赤である。 内科系 外科系
- 皮膚のブツブツから膿や、汁が出ている。 内科系 外科系

いいえ

緑

- 上記に該当しないさまざまな発疹がある。 内科系 外科系
- 最近予防接種を受けた。 内科系 外科系
- 手足、とくに手のひら、足の裏に水をもった発疹があり
□ 内炎もある。 内科系 外科系
- 麻疹、風疹、水ぼうそうなどが周りで流行っている。 内科系 外科系
- 日焼けをした。 内科系 外科系
- 草原や野山で遊んだ。 内科系 外科系
- リンゴのような赤いほっぺたになっている。 内科系 外科系

いいえ

すべての項目に該当しない場合



現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合や
変わらず続く場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。



- かゆみが強いときは、冷たいタオルなどで冷やしてみましょう。
- かゆみ止めの薬を処方してもらっている場合は、服用させてもよいでしょう。
- お子さんがブツブツを搔かないよう、注意しましょう。