

何かを飲み込んだ（大人・こども）

主な 症状

「何か固形物を飲み込んだ」
「食べ物などがのどにつかえた」
「のどに引っかかっている・取れない」 など

赤

- ☐ せきが出ている。
- ☐ いつも通りの息ができない。
- ☐ のど、または、胸が激しく痛む。
- ☐ 血を吐いた。
- ☐ 飲んだものに毒性がありそうだ。
- ☐ とがったものを飲んだようだ。
（針、くぎ、びょう、ガラス、錠剤のシートなど）

いいえ

はい

119

黄

- ☐ のどの異物が取れない。 外科系
- ☐ 吐いた。または、吐き気がある。 内科系 外科系
- ☐ おなかが痛い。 内科系 外科系
- ☐ ボタン型の電池を飲んだようだ。 内科系 外科系
- ☐ 飲んだものがわからない。 内科系 外科系
- ☐ 1円玉より大きなものを飲んだようだ。 内科系 外科系
- ☐ のどに違和感が残っている。 内科系 外科系

いいえ

はい

- ☐ 65歳以上である
- ☐ 15歳以下である
- ☐ 妊娠している
- ☐ 歩けない

はい

119

いいえ

今すぐ受診

緑

- ☐ 何かを飲み込んだが症状はない。 内科系
- ☐ 1円玉より小さなものを飲んだようだ。 内科系 外科系

はい

- ☐ 65歳以上である
- ☐ 15歳以下である
- ☐ 妊娠している
- ☐ 歩けない

はい

今すぐ受診

いいえ

当日又は翌日の
通常時間に受診



- 3日～2週間ほど便の観察をして、飲み込んだものが出たかどうか確認してください。
- 2週間しても出ない、または、不安な場合は消化器科を受診しましょう。
- 受診するときは、何を飲んだか分かる場合は、同じものを持参するようにしましょう。