

咬まれた・刺された(大人・こども)

主な 症状

「かまれた」「(トゲが)刺さった」「(虫に)刺された」
(ヒト、動物、ヘビ、海洋生物(クラゲなど)、
昆虫(ハチなど)、ダニほか)

赤

- ☐ フラフラしている。
- ☐ 頭、顔、頸部をかまれた。(虫刺されを除く)
- ☐ 息が苦しい、または、苦しそうにしている。
- ☐ 胸が押される感じがある。
- ☐ 唇や舌が腫れている。
- ☐ つばやものが飲み込みにくい。
- ☐ かまれた、または、刺された部位以外の皮膚は冷たい、または、白い。
- ☐ 汗をかいている。
- ☐ ドキドキしている。
- ☐ どんどん出血している、または、出血が続いている。
- ☐ 意識がなくなってきた、または、呼びかけにきちんと応答しない。
- ☐ あばれている。

<ヘビにかまれた場合>

- ☐ 毒蛇にかまれた。
- ☐ ぐったりしていて、かまれたヘビの種類がわからない。
- ☐ かまれた部位以外に 突然の蕁麻疹、発疹、かゆみがある。
- ☐ 無毒のヘビに多数かまれた。
- ☐ かまれた部位に、赤い、痛い、腫れ、液体がにじみ出ているなどの症状がある。
- ☐ かまれた傷の周りに強い痛みと腫れがある。

※次の頁へ続く

※前の頁から続き

＜昆虫などに刺された場合＞

- ☐ ハチに口の中を刺された。
- ☐ サソリに刺された。
- ☐ 以前にも同じ動物、昆虫に刺されてひどいアレルギーを起こしたことがある。
- ☐ 刺された場所以外に急にじんましんや赤い斑点、かゆみ、腫れが出てきた。
- ☐ 筋肉のこわばり、腹痛、不安がある。
- ☐ 気持ちが悪い、吐いた、おなかがびくつく。

＜ヒト、動物（ハムスターなどのげっ歯類も含む）の場合＞

- ☐ 狂犬病の予防接種を受けていない犬にかまれた。
- ☐ 胴体、足、腕、手、指、足の指のどこかをかまれた。
- ☐ かまれた部位に、赤い、痛い、腫れ、液体がにじみ出ているなどの症状がある。
- ☐ 発熱がある。

＜海洋生物（クラゲなど）に刺された場合＞

- ☐ カツオノエボシ(電気クラゲ)に刺された。
- ☐ 突然、じんましんが出てきた。
- ☐ 刺されていない腕、足が突然腫れてきた。
- ☐ 動くのが困難なほど痛みがある。

＜ダニの場合＞

- ☐ ダニに対してアレルギー反応を起こしたことがある。

いいえ

はい

119

<ヒト、動物の場合>

- ☐ 糖尿病がある。内科系

<海洋生物（クラゲなど）の場合>

- ☐ 刺された場所に痛みと、赤みと腫れがみられる。内科系 外科系
- ☐ 針が刺さったままの状態である。外科系

<昆虫（ハチなど）の場合>


- ☐ 刺された場所に痛み、腫れ、しびれがある。内科系
- ☐ 刺された場所の熱感と腫れが広がりはじめて48時間以上経つ。内科系
- ☐ 刺された場所の他にも痛み、腫れがある。内科系 外科系
- ☐ 刺された後から頭痛がある。内科系 外科系
- ☐ 発熱、寒気、汗をかいている。外科系
- ☐ 刺した昆虫を取り除くことができない。外科系
- ☐ 刺された部位の皮膚がむけてきた。外科系

<ダニの場合>

- ☐ かまれてから2~4週間たつが、発疹や発熱、悪寒、咽頭痛、頭痛が続いている。内科系 外科系
- ☐ かまれたきずが痛く、腫れ、赤くなって、液体がしみ出てきた。外科系
- ☐ 皮膚の中にダニの頭が入り込んでいて、取り除くことが難しい。外科系

いいえ

はい



 **すべての項目に該当しない場合**
現時点では緊急性はありません。ただし症状が悪化した場合や
変わらず続く場合には、診療所や病院への受診をお勧めします。

※ ハチに刺された場合は、1時間くらいは様子をしっかりとみましょう。



ヘビに咬まれたとき

- 安全な場所へ避難し、咬まれた部位はゆるく固定し、心臓より高い位置に保ちましょう。
- 指輪や腕時計、きつい衣類などはとっておきましょう。

ハチにさされたとき

- 針が残っている場合は、できるだけ早く取り除きますが、直接つまむと中の毒が入ることがあるので注意しましょう。
- 刺された場所をよく洗いましょう。
- 痛みがひどいときは、刺された部位を氷で冷やすと楽になることがあります。